

## معده و اثنی عشر یاراسینا مبتلا اولماق

بعضی آغریلار و علامتler، معده و اثنی عشر یاراسینا دلالت ائله یه بیلر و جدی توتولمالیدیر.



بعضی آغریلار و علامتler، معده و اثنی عشر یاراسینا دلالت ائله یه بیلر و جدی توتولمالیدیر.

معده و اثنی عشری یاراسی نسبتاً شایع ناخوشلوقلارداندیر و هر انسان یوزده 10 الی 15 بو درده مبتلا اولما بیلر.

بو ناخوشلوقون باشلانیشی قارین سانجیسیندان و معده باشی و زنجیرلر؛ نین یانماسی اینن اولار. اولما بیلر مریض غذا یئدیگی زمان آغری حس ائله و زنجیرلر؛ مه و زنجیرلر؛ سین اما معمولاً بئله اولار.

بعضاً آغری و زنجیرلر؛ نین شدتی مریضی گنجه یوخوسوندان آیلدا بیلر و اونو معده شربتلی و یا بیر تکه غذا یئماغا وادار ائله.

البته بوگون بو مریضلیق دقیق معاینه و زنجیرلر؛ لر تشخیص وئرلیر و داوا اینن درمان اولور.

بو ناخوشلوقون عامل و زنجیرلر؛ لریندن اؤز باشینا مسکن و آسپرین مصرف اله و زنجیرلر؛ ماق اولما بیلر. اما بو ناخوشلوقون اساس عاملی هلیکوباکتر میکروبو اولور کی بهداشتی رعایت ائله و زنجیرلر؛ ماق اونون قاباغینی آلا بیلر.